

Əsas Dəyişikliklərin Xülasəsi və İzahlı Qeydlər



Qadağan Edilmiş Siyahı 2026

HƏR ZAMAN QADAĞAN EDİLMİŞ MADDƏ VƏ ÜSULLAR
(YARIŞ MÜDDƏTİNDƏ VƏ YARIŞDAN KƏNAR MÜDDƏTDƏ)

QADAĞAN EDİLMİŞ MADDƏLƏR

S1. Anabolik agentlər

- S1.1-də qadağan edilmiş steroidlərin esterlərinin də qadağan olunduğu dəqiqləşdirilmişdir.

S2. Peptid hormonları, böyümə faktorları, əlaqəli maddələr və mimetiklər

- Peqmolesatid yeni EPO-mimetik agentin nümunəsi kimi əlavə edilmişdir.

S3. Beta-2 Aqonistlər

- Salmeterolun dozalaşdırma intervalları terapeutik təsirdən kənarda potensial ergogenik effektlərin qarşısını almaq üçün yenidən nəzərdən keçirilmişdir. 24 saat ərzində maksimum çatdırılan doza 200 mikrogram olaraq dəyişməz qalır.

S4. Hormon və Metabolik Modulyatorlar

- α - naftoflavon və ya 7,8-benzoflavon kimi də tanınan 2-fenilbenzo[h]xromen-4-on aromataza inhibitorunun nümunəsi kimi əlavə edilmişdir. Bu sintetik maddə əlavələrdə aşkar edilmişdir.
- BAM15 kimi də tanınan 5-N,6-N-bis(2-fluorfenil)-[1,2,5]oksadiazolo[3,4-b]pirazin-5,6-diamin AMP-aktivləşdirilmiş protein kinazın (AMPK) aktivatorunun nümunəsi kimi əlavə edilmişdir. Bu sintetik maddə qida əlavələrində aşkar edilmişdir.

¹ Thoueille P, Danion A, Hostrup M, Petrou M, Deventer K, Buclin T, Girardin F, Mazzoni I, Rabin O, Guidi M. Pharmacometric-based evaluation of salmeterol and its metabolite α -hydroxysalmeterol in plasma and urine: practical implications for doping control. Submitted for publication.

QADAĞAN EDİLMİŞ ÜSULLAR

M1. Qan və Qan Komponentləri ilə Manipulyasiyalar

- Qan və ya qan komponentlərinin götürülməsinin aşağıdakı hallar istisna olmaqla qadağan olunduğu dəqiqləşdirilmişdir: 1) tibbi testlər və ya Doping Nəzarəti daxil olmaqla analitik məqsədlər üçün və ya 2) fəaliyyət göstərdiyi ölkənin müvafiq tənzimləyici orqanı tərəfindən akkreditasiya olunmuş qan toplama mərkəzində donor məqsədləri üçün. Qeyd edilməlidir ki, Trombositlə Zəngin Plazma (TZP) və əlaqəli prosedurlar qadağan deyildir.
- Karbon monoksidin (CO) qeyri-diaqnostik istifadəsi yeni bölmə M1.4 kimi *Qadağan Edilmiş Metodlara* əlavə edilmişdir. CO müəyyən şəraitlərdə eritropoezi artırır. Karbon monoksidin ümumi hemoqlobin kütləsinin ölçülməsi və ya ağciyər diffuziya qabiliyyətinin təyini kimi diaqnostik məqsədlərlə istifadəsi qadağan deyildir. Mövcud ifadələr qeyri-qanuni istifadə ilə təbii yanma proseslərindən (məsələn, siqaret çəkmək) , ətraf mühitdən (məsələn, dəniz qazları) və ya diaqnostik prosedurlardan yaranan qəbul arasında fərq qoymaq üçün seçilmişdir.

M3. Gen və Hüceyrə Dopingi

- Hüceyrə komponentləri (məsələn, nüvə, mitoxondri və ribosom kimi hüceyrə orqanoidləri) normal və ya genetik modifikasiya olunmuş hüceyrələrin istifadəsinə dair mövcud qadağaya əlavə edilmişdir.

YARIŞ MÜDDƏTİNDƏ QADAĞAN EDİLMİŞ MADDƏ VƏ ÜSULLAR

QADAĞAN EDİLMİŞ MADDƏLƏR

S6. Stimullaşdırıcılar

- 2-[Bis(4-fluorfenil)metilsulfinil]asetamid (flmodafinil) və 2-[bis(4 fluorfenil)metilsulfinil]-N-hidroksiasetamid (fladrafenil) S6.A qeyri-spesifik stimulyatorlar siyahısına əlavə edilmişdir. Bu təsdiqlənməmiş maddələr modafinil və adrafenilin güclü analoglarıdır və qida əlavəsi kimi satılır.

S9. Qlükokortikoidlər

- Qlükokortikoid Xaricolunma Müddəti Cədvəlinə aşağıdakı izahat əlavə olunur:
"Uzunmüddətli təsirə malik qlükokortikoid formulalarının istifadəsi, uzunmüddətli sistem absorpsiyası səbəbindən yuyulma müddətindən sonra analiz zamanı aşkar edilə bilən qlükokortikoid səviyyələrinə səbəb ola bilər."

Yeridilmə (tətbiq) üsulu	Qlükokortikoid	Xaricolunma müddəti*
Oral**	Bütün qlükokortikoidlər;	3 gün
	Triamcinolone; triamcinolone acetone istisna olmaqla	10 gün
Əzələdaxili***	Betamethasone; dexamethasone; methylprednisolone	5 gün
	Prednisolone; prednisone	10 gün
	Triamcinolone acetone	60 gün
Yerli inyeksiyalar (o cümlədən periartikulyar, intraartikulyar, peritendinoz və intratendinoz)	Bütün qlükokortikoidlər;	3 gün
	Prednisolone; prednisone; triamcinolone acetone; triamcinolone hexacetone istisna olmaqla	10 gün
Rektal	Bütün qlükokortikoidlər;	3 gün
	Triamcinolone diacetate; triamcinolone acetone istisna olmaqla	10 gün

*"Xaricolumma müddəti" son yeridilən dozadan Yarışdaxili dövrün başlanğıcına qədər olan müddətə aiddir (yəni idmançının iştirak etməsi planlaşdırılan yarışdan əvvəlki gün saat 23:59-dan başlayır, WADA tərəfindən müəyyən idman növü üçün fərqli müddət təsdiq edilmədiyi halda). Bu, qlükokortikoidin minimum təyin oluna bilən konsentrasiya həddini aşağı salınmasına imkan vermək üçündür.

** Oral yollara həmçinin oromukozal, bukkal, diş əti və dilaltı daxildir.

*** Proлонqasiya edilmiş azadolma xüsusiyyəti qlükortikoid tərkibli dərman formalarının istifadəsi qlükotrikoidlərin sorulma vaxtının artmasına səbəb olur ki, bu da maddənin orqanizmdən xaricolumma müddətini artırır.

Xaricolumma Müddəti Cədvəli həmçinin Siyahı TSS-da <https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list#faq-anchor>, eləcə də Qlükokortikoidlər və Terapevtik İstifadə üçün İstisnaları Təlimatlarında mövcuddur <https://www.wada-ama.org/en/resources/therapeutic-use-exemption/glucocorticoids-and-therapeutic-use-exemptions-guidelines>

MONİTORİNG PROQRAMI

- Semaqlutidin sidik monitoringinin tirzepatidi də əhatə etdiyi dəqiqləşdirilmişdir.
- * Əvvəlki dəyişikliklər və dəqiqləşdirmələr haqqında ətraflı məlumat üçün <https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list#faq-anchor> ünvanında Qadağan Edilmiş Siyahı Tez-tez Verilən Suallarına müraciət edin.